

冠動脈インターベンショナル手術  
(撓骨アプローチ)を受けられる

様へ

(ID: \_\_\_\_\_)

)

担当医: \_\_\_\_\_

経過	入院日(手術前日) ( / )	手術当日		術後1日目 ( / )	術後2日目 ( / )	退院日 (術後3日目) ( / )
		手術前	手術後			
達成目標	1. 不安なく治療を受けることができる		2. 合併症なく過ごすことができる			
治療処置			<ul style="list-style-type: none"> <li>●カテーテル穿刺部止血のため手首を圧迫します。2~3時間後に低圧まで減圧し、翌朝まで低圧のまま圧迫を継続します</li> <li>●心電図モニターを装着します</li> <li>●帰宅より下記時間に状態観察を行います(帰宅時・1時間後・2時間後・3時間後・5時間後)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●朝の検温時に手首の圧迫を除去します</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●心電図モニター終了です</li> </ul> 	
点滴		●カテーテル室で点滴を開始します	<ul style="list-style-type: none"> <li>●血管拡張薬を点滴します</li> <li>●抗生剤を点滴します</li> </ul> 	●点滴は終了です		
内服薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カテーテル手術を行うことが決まった時点で抗血小板薬を開始します</li> <li>●手術2日前からビグアイド系糖尿病薬を中止します</li> </ul>	●感染予防のために抗生剤を内服します				●ビグアイド系糖尿病薬を再開します
検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>●採血</li> <li>●胸部レントゲン</li> <li>●心電図</li> <li>●撓骨動脈エコー</li> </ul> 		●心電図	<ul style="list-style-type: none"> <li>●採血</li> <li>●胸部レントゲン</li> <li>●心電図</li> <li>●心筋シンチ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●撓骨動脈エコー</li> <li>●長時間心電図検査</li> <li>●上肢下肢動脈圧測定検査</li> </ul>	
食事	●飲食可能です	●手術前は軽めのお食事をお出しします	<ul style="list-style-type: none"> <li>●帰宅時より飲水可能です</li> <li>●帰宅2時間後より食事可能です</li> </ul> 	●飲食可能です		
活動	●院内歩行可能です	●手術前に手術着に着替えます	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リクライニング車椅子で帰宅します</li> <li>●帰宅1時間は床上安静です</li> <li>●帰宅1時間後よりトイレ歩行可能です</li> </ul>	●心臓リハビリを行います		
清潔	●入浴可能です			●清拭を行います	●入浴可能です	
説明	●術前オリエンテーションを行います			●心臓病教室を行います	●心臓病教室を行います	●退院前に主治医から病状説明を行います
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術同意書を確認します。担当看護師まで渡してください</li> <li>●院内での貴重品管理は自己責任になります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2名まで手術見学ができます</li> <li>●車で来られた家族の方は、車1台分のみ駐車割引券をお渡しします。担当看護師にお声がけください</li> </ul>	●手術後止血を行っている手首には力を入れないでください			

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: \_\_\_\_\_

患者・家族: \_\_\_\_\_