

内視鏡的逆行性胆管造影検査
を受けられる

様へ (ID: _____)

担当医: _____

経過	入院日	検査当日		検査後1日目(退院日)
		検査前	検査後	
月/日	(/)	(/)		(/)
達成目標	1. 検査に対する不安が無く過ごせる	2. 重篤な合併症がなく過ごすことができる 3. 安静・絶食の必要性を理解できる		4. 症状なく経過し、食事を摂ることができる
治療処置	●検査当日に着用する弾性ストッキングのサイズを測ります	●指輪、時計等金属類を外して、連絡があるまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防のために弾性ストッキングをはきます	●鎮静剤を使用したため、帰室時のみモニターを装着します ●術後はストレッチャーで戻ってきます ●酸素の値の低い方は、術後1時間酸素を使用します	
点滴	●午後より右腕に点滴の針を刺します	●朝10時から点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります(朝・夕)		●抗生剤の点滴があります(朝・夕)
内服薬	●通常通り内服して下さい	●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服してください ●それ以外の薬は中止してください		●通常通り内服してください 
検査			●治療3時間後に採血を行います	●医師の指示で朝に採血を行うことがあります
食事	●夕食まで食べて21時以降は食べたり飲んだりしないでください	●朝から絶食となります ●水分摂取はできません 	●3時間後の採血の結果、主治医の指示にて水分摂取開始となります	●朝より食事開始になります
活動	●病院内歩行可	●ベッドで静かにお待ちください	●鎮静剤を使用しているため治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります	●病院内歩行可
清潔	●入浴可	●清拭(タオルで体をお拭きします)		●入浴可
説明	●明日の検査の説明があります 		●治療当日は鎮静剤の影響で大変転びやすいので階段の使用は控え、歩行には十分気をつけてください	
備考		●入れ歯をご使用の方は検査の時に入れ歯をしてきてください		

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: _____

患者・家族: _____