

冠動脈インターバルシヨソ手術
(橈骨アプローチ) を受けられる

様へ

(ID: _____)

)

担当医: _____

経過	入院日 (手術前日) (/)	手術当日		術後1日目 (/)	術後2日目 (/)	退院日 (術後3日目) (/)
		手術前	手術後			
達成目標	1. 不安なく治療を受けることができる		2. 合併症なく過ごすことができる			
治療処置			<ul style="list-style-type: none"> ●カテーテル穿刺部止血のため手首を圧迫します。2~3時間後に低圧まで減圧し、翌朝まで低圧のまま圧迫を継続します ●心電図モニターを装着します ●帰宅より下記時間に状態観察を行います (帰宅時・1時間後・2時間後・3時間後・5時間後) 	<ul style="list-style-type: none"> ●朝の検温時に手首の圧迫を除去します 	<ul style="list-style-type: none"> ●心電図モニター終了です 	
点滴		●カテーテル室で点滴を開始します	<ul style="list-style-type: none"> ●血管拡張薬を点滴します ●抗生剤を点滴します 	●点滴は終了です		
内服薬	<ul style="list-style-type: none"> ●カテーテル手術を行うことが決まった時点で抗血小板薬を開始します ●手術2日前からビグアナイド系糖尿病薬を中止します 	●感染予防のために抗生剤を内服します				●ビグアナイド系糖尿病薬を再開します
検査	<ul style="list-style-type: none"> ●採血 ●胸部レントゲン ●心電図 ●橈骨動脈エコー 		●心電図	<ul style="list-style-type: none"> ●採血 ●胸部レントゲン ●心電図 ●心筋シンチ 	<ul style="list-style-type: none"> ●橈骨動脈エコー ●長時間心電図検査 ●上肢下肢動脈圧測定検査 	
食事	●飲食可能です	●手術前は軽めのお食事をお出しします	<ul style="list-style-type: none"> ●帰宅時より飲水可能です ●帰宅2時間後より食事可能です 	●飲食可能です		
活動	●院内歩行可能です	●手術前に手術着に着替えます	<ul style="list-style-type: none"> ●リクライニング車椅子で帰宅します ●帰宅1時間は床上安静です ●帰宅1時間後よりトイレ歩行可能です 	●心臓リハビリを行います		
清潔	●入浴可能です			●清拭を行います	●入浴可能です	
説明	●術前オリエンテーションを行います			●心臓病教室を行います	●心臓病教室を行います	●退院前に主治医から病状説明を行います
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●手術同意書を確認します。担当看護師まで渡してください ●院内での貴重品管理は自己責任になります 	<ul style="list-style-type: none"> ●2名まで手術見学ができます ●車で来られた家族の方は、車1台分のみ駐車割引券をお渡しします。担当看護師にお声がけください 	●手術後止血を行っている手首には力を入れないでください			

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: _____

患者・家族: _____