

胆道外科留置術で入院された _____ 様へ (ID: _____) 担当医: _____

経過	入院日	2日目		3日目	4日目	5日目		6日目	7日目	8日目	9日目 (退院日)
		(治療前)	(治療後)			(治療前)	(治療後)				
月/日	(/)	(/)		(/)	(/)	(/)		(/)	(/)	(/)	(/)
達成目標	1. 不安なく治療に臨むことができる			2. 症状無く経過し、食事を摂ることができる		3. 不安なく治療に臨むことができる 4. 重篤な合併症がなく過ごす事が出来る			5. 症状無く経過し、退院することができる		
治療処置	●治療当日に着用する弾性ストッキングのサイズを測ります	●指輪、時計等金属類を外して、連絡があるまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防のために弾性ストッキングをはきます	●術後、鼻より管が入ってきます ●術後はストレッチャーで戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後1時間酸素を使用します			●指輪、時計等金属類を外して、連絡があるまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防のために弾性ストッキングをはきます	●治療で鼻の管を抜きます ●術後はストレッチャーで戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後1時間酸素を使用します				
点滴	●午後より右腕に点滴の針を2本挿入します	●朝10時から点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります(朝・夕) 	●抗生剤の点滴があります(朝・夕)			●朝10時から点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります(朝・夕) 	●抗生剤の点滴があります(朝・夕)				
内服薬	●通常通り内服して下さい	●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して下さい ●それ以外の薬は中止して下さい	●通常通り内服して下さい			●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して下さい ●それ以外の薬は中止して下さい	●通常通り内服して下さい				
検査			●治療後3時間後に採血を行います 	●医師の指示で朝に採血を行います			●治療後3時間後に採血を行います 	●医師の指示で朝に採血を行います		●レントゲン、採血が入ることがあります	
食事	●夕食まで食べて21時以降は食べたり飲んだりしないでください	●朝から絶飲食となります 	●3時間後の採血の結果、主治医の指示にて水分摂取可能となります	●採血の結果で朝より食事開始になります	●夕食まで食べて21時以降は食べたり飲んだりしないでください	●朝から絶飲食となります 	●3時間後の採血の結果、主治医の指示にて水分摂取可能となります	●採血の結果で朝より食事開始になります	●米飯 		
活動	●病院内歩行可	●ベッドで静かにお待ち下さい	●鎮静剤を使用しているため治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります	●病院内歩行可能		●ベッドで静かにお待ち下さい 	●鎮静剤を使用しているため治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります	●病院内歩行可能			
清潔	●入浴可	●清拭(タオルで体をお拭きします)						●入浴可			
説明	●明日の治療の説明があります		●治療当日は鎮静剤の影響で大変転びやすいので階段の使用は控え、歩行には十分気をつけて下さい	●鼻より管が入るため歩行時は転倒に注意して下さい	●明日の治療の説明があります		●治療当日は鎮静剤の影響で大変転びやすいので階段の使用は控え、歩行には十分気をつけて下さい				
備考		●入れ歯をご使用の方は検査の時に入れ歯をしてきてください					●入れ歯をご使用の方は検査の時に入れ歯をしてきてください				●10時頃に会計ができます

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: _____

患者・家族: _____