

| 経過 | 入院日 | 2日目 (治療前) | 2日目 (治療後) | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 退院日 |
|------|---------------------------------|---|--|---------------------|--|-------|---|---|-------|------------------|
| 月/日 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) |
| 達成目標 | 1. 不安なく治療を受けることができる | | | 2. 症状なく、食事をとることができる | | | 3. 合併症なく早期に退院できる | | | |
| 達成目標 | ●治療当日に着用する弾性ストッキングのサイズを測ります | ●指輪、時計等金属類を外して連絡があるまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防のために弾性ストッキングをはきます | ●治療後はストレッチャーで戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後1時間酸素を使用します | | | | | | | |
| 治療処置 | ●午後より右腕に点滴の針を2本挿入します | ●朝10時から点滴を行います ●抗生剤の点滴があります (朝・夕) |  | ●抗生剤の点滴があります (朝・夕) | | | | | | |
| 点滴 | ●通常通り内服してください | ●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して下さい ●それ以外の薬は中止して下さい | | ●通常通り内服して下さい | | |  |  | | |
| 内服薬 | | | ●治療3時間後に採血を行います  | ●医師の指示で朝に採血を行います | ●適宜、採血を行います。合併症が出現した場合、内視鏡を行う場合があります | | | | | |
| 検査 | ●夕食までに食べて21時以降は食べたり飲んだりしないでください | ●朝から絶飲食となります  | ●安静解除後に水分開始となります | ●採血の結果で昼より食事開始になります | ●米飯  | | | | | |
| 食事 | ●一般食が出来ます | ●ベッドで静かにお待ち下さい | ●鎮静剤を使用しているため治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります | ●病院内歩行可 | | | | | | |
| 活動 | ●制限はありません | ●清拭 (タオルで体をお拭きします) | | | ●シャワー浴 | ●入浴 | | | | |
| 清潔 | ●明日の治療の説明があります | | ●治療当日は鎮静剤の影響で大変転びやすいので階段の使用は控え、歩行には十分気をつけて下さい | | | | | | | |
| 説明 | | ●入れ歯をご使用の方は検査の時に入れ歯をしてきてください | | | | | | | | ●10時頃に会計ができあがります |

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師:

患者・家族: